




Quels sont les traitements ?



Prise d'antibiotiques et injection d'antitoxine diphtérique pour les formes sévères.



Une personne atteinte de diphtérie doit être isolée durant le traitement.



Que faire en cas de contact avec une personne infectée ?



Surveillez votre état de santé pendant les 7 jours qui suivent votre dernier contact.



En cas de symptômes, consultez rapidement



Portez un masque et limitez vos contacts si vous présentez des symptômes



En cas de doute, parlez-en à votre médecin ou composez le **1733**

PLUS D'INFOS SUR LA DIPHTÉRIE ?



CONSULTEZ NOTRE SITE INTERNET
WWW.VIVALIS.BRUSSELS



INFORMATION À DESTINATION DES PROFESSIONNELS


La diphtérie est une maladie à déclaration obligatoire dès suspicion clinique pour sa forme ORL et dès confirmation diagnostique pour sa forme cutanée, productrice de toxine.

COMMENT DÉCLARER UNE MALADIE ?



En cas d'urgence, vous pouvez nous contacter par téléphone au **02 552 01 91**.

DIPHTÉRIE



La diphtérie est une infection bactérienne grave et contagieuse qui touche généralement le nez, la gorge ou la peau en cas de plaie.

La vaccination est le seul moyen de s'en protéger !



vivalis.brussels



Comment ça se transmet ?


La diphtérie est une maladie contagieuse qui se transmet par :



La toux



Les postillons



Les contacts rapprochés




Le contact direct avec une plaie infectée (homme ou animal).



Une personne non traitée reste contagieuse jusqu'à 2 semaines.



Quel délai entre le contact avec la bactérie et les premiers symptômes ?



Le temps d'incubation est de 2 à 5 jours en moyenne et peut aller jusqu'à 7 jours.



Pendant cette période, la personne peut ne présenter aucun signe visible.



Quels sont les symptômes ?

La maladie peut se présenter sous deux formes distinctes :

La forme classique (ORL)



Mal de gorge



Fièvre



Ganglions et gonflement du cou





Dépôt grisâtre dans la gorge.



Signe d'urgence : **difficulté à respirer ou à avaler.**

La forme cutanée



Plaie qui ne cicatrise pas, dépôt grisâtre sur la plaie.



Comment prévenir la maladie ?



La vaccination est le seul moyen efficace de prévenir la maladie



La vaccination est gratuite avant l'âge de 18 ans et dans certaines conditions



Rappel vaccinal recommandé tous les 10 ans



Le vaccin couvre plusieurs maladies (Diphtérie, Coqueluche et Tétanos).



Calendrier vaccinal

